



ResTrial GastroEndo s.r.o.

Klinika ResTrial, Sofijské náměstí 3404/3, Praha 4 Modřany

Tel: 242 451 010, email: gastroendo@restrial.com

Informovaný souhlas pacienta s endoskopií horního zažívacího traktu (esophago – gastro – duodenoskopie)

Pacient:

.....
jméno, příjmení, rodné číslo

Vážený a milý paciente,

k vyšetření, které Vám doporučujeme, je potřeba Vašeho písemného souhlasu. Abyste se mohl/a rozhodnout, informujeme Vás tímto o způsobu, významu a případných komplikacích plánovaného vyšetření.

Proč doporučujeme endoskopii horního zažívacího traktu?

Čím dříve a přesněji lékař určí povahu a rozsah onemocnění, tím bývá léčba úspěšnější. Na základě Vašich obtíží nebo jako preventivní vyšetření k časnému rozpoznání možných chorobných změn v zažívacím traktu je u Vás doporučeno provedení endoskopie jícnu, žaludku a dvanácterníku. V současné době neexistuje alternativní výkon, kdy by bylo možno vyšetřit jícen, žaludek a dvanácterník a současně odebrat slizniční vzorky pro další vyšetření a případně léčebně zasáhnout v rámci jednoho zdravotního výkonu.

Vyšetřovací postup

Těsně před začátkem výkonu Vám může být (podle uvážení lékaře) sprejem aplikována lokální anestezie hltanové branky („stříknutí do krku“). Dále Vám může být injekční formou podána premedikace (pro uklidnění a relaxaci) do žilního systému. V poloze na levém boku Vám bude skrze náustek, který budete po celou dobu vyšetření svírat rty a zuby, zaveden endoskopický přístroj do jícnu, žaludku a dvanácterníku (příčemž dýchací cesty jsou po celou dobu vyšetření volné). Pokud to bude nutné, budou během vyšetření odebrány slizniční vzorky, případně provedeny léčebné zákroky např. snesení chorobné slizniční abnormality, ošetření krvácející cévy či vředu, odstranění cizího tělesa. Všechny tyto výkony jsou nebolestivé. Během vyšetření můžete přechodně cítit nutkání na zvracení, říhání a tlaky v břiše. Tyto obtíže jsou běžné a po vyšetření pominou. Vyšetření trvá zhruba 5-10 minut.

Diagnostické a léčebné (terapeutické) zákroky během vyšetření:

Biopsie – odběr vzorku tkáně se provádí malými kleštěmi a je bezbolestný.

Polypektomie – snesení slizničního výrůstku – polypu. Zárok se provádí polypektomickou kličkou za použití elektrokoagulačního přístroje a je též bezbolestný.

Klipování – aplikace speciálních klipů k ošetření slizničních perforací nebo zástavě krvácení.

Opich – aplikace léčiv do sliznice speciální endoskopickou jehlou.

Medikace

Pacienti užívající léky ovlivňující krevní srážlivost jako je například Warfarin (Lavarin), Clopidogrel (Plavix, Trombex), Prasugrel (Efient) a další antikoagulantia jako je např. Pradaxa, Arixtra, Xarelto musí informovat vyšetřujícího lékaře o této medikaci. Informujte, prosím, sestru či vyšetřujícího lékaře o případných alergických reakcích na léky a o závažných onemocněních, pro která jste léčen. Důležitá je i informace o případném zeleném zákalu – glaukomu.

Možné komplikace

Tak jako při každém invazivním vyšetření, může i u gastroscopie dojít ke komplikacím, které jsou však velmi vzácné. Pokud nemáte zvláštní sklon ke krvácení, vede odběr vzorku tkáně pouze k malému přechodnému nevýraznému krvácení. Alergické reakce na uklidňující injekci nebo na umrtvení hltanu jsou velmi vzácné, stejně tak poranění nástrojem. Abychom snížili riziko krvácení a komplikace podaného místního umrtvení na minimum, **zodpovězte prosím následující otázky:**



ResTrial GastroEndo s.r.o.

Klinika ResTrial, Sofijské náměstí 3404/3, Praha 4 Modřany

Tel: 242 451 010, email: gastroendo@restrial.com

1. Máte zvýšený sklon ke krvácení již při malých poraněních nebo po vytržení zubu?	Ne - Ano
2. Užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost? (Anopyrin, Godasal, Warfarin, Lawarin, Xarelto, Pradaxa, Arixtra apod.)	Ne - Ano
3. Trpíte sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, lékům, náplastem, lékům na místní umrtvení?	Ne - Ano
4. Jste těhotná?	Ne - Ano
5. Trpíte chronickým onemocněním (např. zelený zákal, epilepsie)? Jestliže ano, kterým?	Ne - Ano

V případě příznaku vážných komplikací po gastrokopii (např. prudká bolest v břiše, černá stolice) kontaktujte neprodleně nejbližší chirurgické oddělení.

Chování před a po vyšetření

Na vyšetření se laskavě dostavte nalačno, minimálně 6 hodin před vyšetřením nejezte, 4 hodiny nepijte, v den vyšetření nekuřte.

Po vyšetření se dle potřeby posadíte v čekárně a počkáte na odeznění podaných léčiv. Lokální anestetikum (stříknutí do krku) ovlivňuje polykání, proto jíst a pít můžete až po odeznění anestetika (cca 30 minut). Pokud Vám byla podána premedikace na uklidnění, vyvarujte se v den vyšetření řízení dopravních prostředků a jiných činností, které vyžadují pozornost. Dále se řiďte radami vyšetřujícího lékaře.

Pokud máte nějaký dotaz a nebo jste něčemu neporozuměl/a, prosím zeptejte se.

Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že se mi dostalo plného poučení a vysvětlení všeho, co je obsahem informovaného souhlasu. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a, měl/a jsem možnost položit lékaři doplňující otázky, na které mi srozumitelně a uspokojivě odpověděl a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu: Esophago-gastro-duodenoskopie, odběr bioptických vzorků, případně polypektomie. Toto rozhodnutí činím svobodně a při plném vědomí.

V Praze dne:..... Vlastnoruční podpis pacienta:.....

Jméno lékaře: Podpis lékaře:

V případě, že jste u nás na první návštěvě vyplňte, prosím, následující informace:

Nemoci, se kterými se léčíte:

Léky, které užíváte:.....

Alergie:.....

Prodělané operace:.....

Prodělané úrazy:.....

Alkohol: ne x ano Kuřák: ano x ne

Měl/ měla/ jste někdy vyšetření žaludku – Gastrokopii? Pokud ano, kdy?.....

Měl/ měla/ jste někdy vyšetření střev – Kolonoskopii? Pokud ano, kdy?.....

Vaše adresa.....

Tel. číslo:..... E-mail: