



## Informovaný souhlas pacienta s provedením jícnové high-resolution manometrie

Pacient: .....

*jméno, příjmení, rodné číslo*

### **Vážený a milý paciente,**

k vyšetření, které Vám doporučujeme, je potřeba Vašeho písemného souhlasu. Abyste se mohl/a rozhodnout, informujeme Vás tímto o způsobu, významu a případných komplikacích plánovaného vyšetření.

### **Proč doporučujeme jícnovou high-resolution manometrii?**

High-resolution manometrie (HRM) je funkční vyšetření jícnu, které se provádí zejména při poruchách polykání a slouží tak k diagnostice různých typů poruchy motility (hybnosti) jícnu, své opodstatnění má také u pacientů před či po antirefluxní operaci a dále též v rámci vyšetřování příčiny určitých nespecifických příznaků (např. bolest na hrudi). Cílem je tedy stanovit přesnou diagnózu, na základě které lze doporučit vhodnou léčbu.

### **Příprava před vyšetřením**

K vyšetření se dostavíte nalačno – minimálně 6 hodin nejíst a nepít. U pacientů s podezřením na achalázii jícnu je nutné delší lačnění (určí odesílající lékař). Některé léky bude nutno před vyšetřením vysadit (prokinetika, anticholinergika, spasmolytika). V každém případě je třeba veškerou medikaci a nutnost ev. vysazení konzultovat s odesílajícím lékařem.

### **Vyšetřovací postup**

Vsedě po lokálním znecitlivění sliznice nosu anestetickým gelem s mesocainem zavedeme nosní dírkou tenkou hadičku (sondu) skrz jícen do žaludku, k snazšímu zavedení sondy pomáhá polykání vody. Následně se položíte na záda na vyšetřovací lehátko. Během vyšetření Vám budou podávány do úst stříkačkou malé doušky (5 ml) vody, které budete na výzvu polykat, během čehož bude lékař zaznamenávat a hodnotit průběh polykací vlny v jícnu. Po skončení měření bude sonda vytažena a bezprostředně po nekomplikovaném vyšetření můžete odejít domů, najíst se, napít a zpět užívat vysazené léky.

### **Alternativní možnosti výkonu**

Adekvátní alternativa tohoto vyšetření není.

### **Možné komplikace**

Komplikace při high-resolution manometrii jsou zcela výjimečné a zároveň se nejedná o závažné stavy. Při zavádění sondy může dojít k mírnému krvácení z nosu při pohmoždění sliznice dutiny nosní či hrdla.

**Pokud máte nějaký dotaz a nebo jste něčemu neporozuměl/a, prosím zeptejte se.**

**Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že se mi dostalo plného poučení a vysvětlení všeho, co je obsahem informovaného souhlasu. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a, měl/a jsem možnost položit lékaři doplňující otázky, na které mi srozumitelně a uspokojivě odpověděl a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu: jícnová high-resolution manometrie.**

**Toto rozhodnutí činím svobodně a při plném vědomí.**

V Praze dne: ..... Vlastnoruční podpis pacienta: .....

Jméno lékaře: ..... Podpis lékaře: .....

---

**V případě, že jste u nás na první návštěvě vyplňte, prosím, následující informace:**

Nemoci, se kterými se léčíte: .....

Léky, které užíváte .....

Alergie: .....

Prodělané operace .....

Prodělané úrazy: .....

Alkohol: ne x ano ..... Kuřák: ano x ne

Měl/ měla/ jste někdy vyšetření žaludku – Gastroskopii? Pokud ano, kdy?.....

Vaše adresa .....

Tel. číslo: ..... E-mail: .....

Vyplní lékař

Eckardt skóre	Dysfagie	Regurgitace	Bolest na hrudi	Hubnutí (kg)
0	žádné	žádné	žádné	žádné
1	příležitostně	příležitostně	příležitostně	< 5
2	denně	denně	denně	5 - 10
3	s každým jídlem	s každým jídlem	s každým jídlem	> 10